




## 2. 自体脂肪移植隆胸术

自体颗粒脂肪注射隆胸具有来源丰富取材方便，移植及术后处理方法简单，术后并发症相对较少，组织相容性明显优于乳房假体。无免疫排斥现象，长期效果稳定，手感真实等优点。

适用人群：

- 不接受假体隆胸的女性
- 乳房基础较好，皮肤无明显松弛，仅需在形态上做一些调整和改善，或有着既想瘦身又想丰胸的双重需求的女性

慎用人群：乳腺癌家族史者慎行此手术

并发症：

纤维结节，钙化，脂肪液化及感染等

## 1. 假体隆胸术

胸部无痕假体隆乳术是指通过腋下切口把医用硅胶假体植入到乳房下，使乳房体积扩大，形态丰满匀称，改善女性体积，恢复女性特有的曲线美的一种手术。

特点：

- 选择切口在腋下,术后胸部无痕迹
- 乳房形态丰满，匀称自然
- 选用最先进安全的乳房假体
- 术式安全，损伤小，恢复快

适用人群：

- 天生乳房发育不良者；
- 轻度乳房下垂或缺失者；
- 哺乳或生育后所至的乳腺萎缩。

可能的并发症：与其他任何外科手术一样，假体隆乳术可能性的并发症有：出血，感染，包膜挛缩变硬，乳头感觉异常等。

维美整形美容中心



RESTORE  
COSMETIC & SKIN SURGERY

胸部无痕  
隆胸术

#### 4. 乳晕缩小整形术

乳晕缩小术通过手术切除过多乳晕组织，使乳晕与乳房大小比例相对称的手术方法。正常乳晕直径为4-4.5cm，超过此范围为乳晕过大。多见于女性在怀孕生育后乳晕变大变黑，或乳晕先天较大，外形不够对称。

特点：

- 局部麻醉，手术有痛感
- 乳晕环周切口，隐蔽不留痕迹
- 不伤及乳晕及乳腺组织，不影响哺乳

适用人群：

- 乳晕直径超过4.5cm
- 乳晕大小与乳房大小比例不协调



#### 3. 乳房上提术

由于皮肤结构特殊、皮下脂肪疏松、胸部肌肉发育不良，不注意维持自己体重的稳定，多胎经产妇或哺乳时间较长的女性和突然消瘦者的女性容易造成乳房下垂。乳房下垂必须通过乳房上提术来给予矫正。

乳房上提术有很多种，根据乳房的形态和乳晕大小以及下垂的程度，如果乳房体积过小，可在乳房上提的同时植入假体增大乳房体积。术后会使乳房变得饱满和挺拔，乳晕和乳头的位置得到矫正。

适用人群：

- 减肥后乳房下垂。主要是减肥后乳房内脂肪组织与皮肤松弛所致
- 老年乳房下垂。
- 缺乏锻炼或哺乳所致的乳房轻度松垂
- 乳头乳晕指向下方，位置低于乳房下皱襞



一对一专家咨询  
订制你的专属完美方案

电话：  
0402 984 786 | 03 9690 0900

邮箱：  
info@restorecosmeticsurgery.com.au

地址：  
Level 4, Suite 409, 370 St Kilda Road,  
Melbourne 3004

## 5. 乳头缩小整形术

乳头缩小整形术通过手术的方法使过大的乳头（乳头肥大）复原为正常的高度和直径的乳头。乳头的正常值：直径6-8mm，高7-9mm，大于此值即为乳头过大。常发生在男性女性化和女性过度发育者。

适合人群：

- 乳头肥大，影响美观
- 已完成哺乳或不考虑哺乳者

手术时间：

乳头缩小术的手术时间大约一小时，通常可以在局麻下进行。

可能的风险：

- 感染
- 乳头麻木
- 外形不满意
- 乳头坏死
- 影响哺乳功能



一对一专家咨询  
订制你的专属完美方案

电话：  
0402 984 786 | 03 9690 0900

邮箱：  
info@restorecosmeticsurgery.com.au

地址：  
Level 4, Suite 409, 370 St Kilda Road,  
Melbourne 3004

## 6. 乳头内陷矫正术

乳头不能凸出而是向内凹陷，称为乳头内陷。乳头内陷的程度因人而异，轻者仅表现为不同程度的乳头低平或回缩，受刺激后可突出或可挤出乳头。重者表现为乳头完全陷于乳晕内，无法被牵出，呈火山口状，并常伴有分泌物或异物。

乳头凹陷的分类和治疗：

- 一度为部分乳头内陷，乳头颈部存在，能轻易被挤出，挤出后乳头大小与常人相似，次类凹陷乳头可用保险疗法。如使用乳头吸引器治疗
- 二度为乳头完全凹陷于乳晕之中，但可用手挤出乳头，乳头较正常小，多半无乳头颈部，常需要手术治疗
- 三度为乳头完全埋在乳晕下方，无法使内陷乳头挤出，需要手术治疗

乳头凹陷矫正术：

- 可在局麻下进行手术，约30分钟
- 在乳头旁作一小切口分离切断乳头下方的导管，使乳头凸出
- 用可吸收缝线缝合乳头基底部以防止凹陷重发